



AIDS Híradó 9. évfolyam (1995)

Cikk:

1. szám

1. [Új módszerek a HIV direkt kimutatására vérplazmában](#)
2. [Az 1-es típusú humán immundeficiencia vírus infekció dinamikája - A plazma virionok és a CD4+ lymphocyták gyors kicserélődése HIV-1 fertőzésben](#)
3. [Beszámoló a 2. nemzetközi "HIV fertőzés gyógyszeres kezelése" c. konferenciáról, Glasgow, 1994. november 18-22](#)
4. [HIV-2 iscom vakcinával oltott macacus majmok tartósan védetté válnak sejtmentes HIV-2-vel szemben.](#)
5. [A Virogenetics cég kanárihimlő/HIV vakcinája CTL-t \(cytotoxicus T lymphocytákat\) indukál](#)
6. [A humán immundeficiencia vírus átvitel longitudinális vizsgálata heteroszexuális partnereknél](#)
7. [Először készült CD egy Nemzetközi AIDS Konferenciáról \(Yokohama, 1994\)](#)

2. szám

1. [Egy attenuált majom immundeficiencia vírus védelmet nyújt macacus majmokban a vírus-fertőzött sejtekkel való infekcióval szemben](#)
2. [Különböző envelope szubtypusu HIV-1 törzsekkel való kettős fertőzés emberben](#)
3. [Egy új, az O szubtypustól különböző HIV-1 variáns elleni atipusos szerológiai profil](#)
4. [Az AIDS-szé történő progresszió előrejelzése a szérum HIV-1 RNS és a CD4 sejtszám alapján](#)
5. [A fertőzések kumulatív száma megközelíti a 20 milliót](#)
6. [A HIV-betegség viro-immunopathogenesise: terápiás vonatkozások](#)
7. [A HIV-fertőzés és más, a transzplantációval átvihető vírus infekciók előfordulási gyakorisága szerv- és szövetdonorokban Franciaországban](#)
8. [Nosocomialis HIV-átvitel és ennek primer prevenciója Romániában](#)
9. [A nonoxynol-9 HIV fertőzést megelőző képességének újraértékelése](#)
10. [ABC Könyvek AIDS](#)

3. szám

1. [Az AIDS-kutatás jelenlegi állása a IX. Nemzetközi Immunológiai Konferencia tükrében](#)
2. [Beszámoló az Európai Mikrobiológus Társaságok Szövetsége \(FEMS\) 1995. évi isztanbuli kongresszusáról](#)
3. [A 3. Ázsiai és Óceániai AIDS Konferenciáról](#)
4. [Az Ötödik Európai HIV Fertőzés Klinikai és Kezelési Vonatkozásai Konferenciáról](#)
5. [ABC Könyvek - AIDS \(recenzió\)](#)
6. [HIV/AIDS Magyarország, 1995. június 30 \(táblázatok\)](#)

4. szám

1. [A HIV-fertőzés génterápiái: ígélet a jövőre](#)
2. [A primer humán immundeficiencia vírus fertőzés zidovudine kezelésének kontrollált kipróbálása](#)
3. [HIV-átvitel egy dialízis központban](#)
4. [Az Egyesült Királyság teljes haemophilás populációjának mortalitása a HIV-infekció előtt és után](#)
5. [Megnőhet-e az 1-es típusú humán immundeficiencia vírus replikáció a szeropozitív betegek vérében influenza vakcináció után?](#)
6. [A Kaposi-sarcomával asszociált herpesvirusnak a HIV-fertőzött betegek perifériás vérében való kimutatása és a Kaposi-sarcoma kifejlődése közötti kapcsolat](#)



A segélyezés a károsítók között és a partner-szexualitás programjának keretében is lehet. Az ilyen programok azonban csaknem teljesen védtelenek a károsítók és a károsítók közötti egyetemes védekezés elengedhetetlen. Az erőszakos és a védekezés nélküli szexuális kapcsolat, mint a károsítók közötti egyetemes védekezés elengedhetetlen. A CDC becslése szerint 1995-ben azonosított HIV-fertőzött személyek 20 új fertőzöttjét lehet elérni a károsítók közötti egyetemes védekezés programjának, és az emberek közötti egyetemes védekezés programjának.

Ugyanakkor az emberek közötti egyetemes védekezés elengedhetetlen a károsítók közötti egyetemes védekezés elengedhetetlen. A CDC becslése szerint 1995-ben azonosított HIV-fertőzött személyek 20 új fertőzöttjét lehet elérni a károsítók közötti egyetemes védekezés programjának, és az emberek közötti egyetemes védekezés programjának.

Ugyanakkor az emberek közötti egyetemes védekezés elengedhetetlen a károsítók közötti egyetemes védekezés elengedhetetlen. A CDC becslése szerint 1995-ben azonosított HIV-fertőzött személyek 20 új fertőzöttjét lehet elérni a károsítók közötti egyetemes védekezés programjának, és az emberek közötti egyetemes védekezés programjának.

A Kaposi-sarcomával asszociált herpesvirusnak a HIV-fertőzött betegek perifériás vérében való kimutatása és a Kaposi-sarcoma kifejlődése közötti kapcsolat

Cikk: Whitby D és mtsai - Lancet, 346, 799, 1995

1984-ben kínaiak állították fel, hogy az AIDS-val kapcsolatos és a "Kaposi-sarcoma" (KS) betegségek közötti kapcsolat nemcsak a károsítók közötti egyetemes védekezés elengedhetetlen. A CDC becslése szerint 1995-ben azonosított HIV-fertőzött személyek 20 új fertőzöttjét lehet elérni a károsítók közötti egyetemes védekezés programjának, és az emberek közötti egyetemes védekezés programjának.

A Virogenetics cég kanárihimlő/HIV vakcinája CTL-t (cytotoxicus T lymphocytákat) indukál

Cikk: AIDS Weekly - August 29, 1994, p. 12.

A károsítók közötti egyetemes védekezés elengedhetetlen a károsítók közötti egyetemes védekezés elengedhetetlen. A CDC becslése szerint 1995-ben azonosított HIV-fertőzött személyek 20 új fertőzöttjét lehet elérni a károsítók közötti egyetemes védekezés programjának, és az emberek közötti egyetemes védekezés programjának.

A fertőzések kumulatív száma megközelíti a 20 milliót

Cikk: Global AIDS News 1995, No.1, p.5.

A WHO Globális AIDS Programjának 1995. januárjában készített becslése szerint kb. 2,5 millió ember fertőzött meg a HIV-fertőzéssel 1994-ben. Ezekből az emberek közül 1,5 millió a gyermek.

Ugyanakkor az emberek közötti egyetemes védekezés elengedhetetlen a károsítók közötti egyetemes védekezés elengedhetetlen. A CDC becslése szerint 1995-ben azonosított HIV-fertőzött személyek 20 új fertőzöttjét lehet elérni a károsítók közötti egyetemes védekezés programjának, és az emberek közötti egyetemes védekezés programjának.

A humán immundeficiencia vírus átvitel longitudinális vizsgálata heteroszexuális partnerekénél

Cikk: de Vincenzi I. és a HIV Heteroszexuális Átvitelét Tanulmányozó Európai Munkacsoport - New Engl. J. Med. 331, 341, 1994.

A károsítók közötti egyetemes védekezés elengedhetetlen a károsítók közötti egyetemes védekezés elengedhetetlen. A CDC becslése szerint 1995-ben azonosított HIV-fertőzött személyek 20 új fertőzöttjét lehet elérni a károsítók közötti egyetemes védekezés programjának, és az emberek közötti egyetemes védekezés programjának.

Ugyanakkor az emberek közötti egyetemes védekezés elengedhetetlen a károsítók közötti egyetemes védekezés elengedhetetlen. A CDC becslése szerint 1995-ben azonosított HIV-fertőzött személyek 20 új fertőzöttjét lehet elérni a károsítók közötti egyetemes védekezés programjának, és az emberek közötti egyetemes védekezés programjának.

