



A primer HIV-fertőzés: Új orvosi szükséghelyzet?

Cikk: Jolles S és mtsai - Brit. Med. J. 312, 1243, 1996

A HIV-fertőzést ma még leggyakrabban csak óvókat a fertőzés után, az első opportunista infekciók kialakulása idején ismerik fel. A frissen fertőzöttek jelentős részében (becsült aránya 55-95%-ban) kifejeződik egy mononucleosis-szerű primer tünetes HIV-fertőzés, amely változatos klinikai manifestációk előidézője is ma már általánosan elfogadott. A primer HIV-fertőzés felismerése lehetővé teszi a HIV-infekció diagnosztikájának korai felállítását, és ezáltal a korai terápia megkezdését is.

A primer HIV-fertőzés tünetei általában 2-4 héten belül, bár néha később is megjelenhetnek. A tünetek nagy csoportját az általános tünetek (lásd, táblázat) képezik, ezek között a leggyakoribbak a fejfájás, a nyirokcsomók megnagyobbodása, a bőr kiütése és a nyirokcsomók megnagyobbodása. A tünetek gyakorisága nagy, a primer HIV-fertőzés tünetei általában 2-4 héten belül, bár néha később is megjelenhetnek. A tünetek nagy csoportját az általános tünetek (lásd, táblázat) képezik, ezek között a leggyakoribbak a fejfájás, a nyirokcsomók megnagyobbodása, a bőr kiütése és a nyirokcsomók megnagyobbodása.

A primer HIV-fertőzést az HIV vagy CMV okozta mononucleosis, a lymphadenitis, a fejfájás, a nyirokcsomók megnagyobbodása, a bőr kiütése és a nyirokcsomók megnagyobbodása jellemzi. A tünetek nagy csoportját az általános tünetek (lásd, táblázat) képezik, ezek között a leggyakoribbak a fejfájás, a nyirokcsomók megnagyobbodása, a bőr kiütése és a nyirokcsomók megnagyobbodása.

A primer HIV-fertőzés gyakori következménye a nyirokcsomók megnagyobbodása, a lymphadenitis, a fejfájás, a nyirokcsomók megnagyobbodása, a bőr kiütése és a nyirokcsomók megnagyobbodása. A tünetek nagy csoportját az általános tünetek (lásd, táblázat) képezik, ezek között a leggyakoribbak a fejfájás, a nyirokcsomók megnagyobbodása, a bőr kiütése és a nyirokcsomók megnagyobbodása.

A primer HIV-fertőzés gyakori következménye a nyirokcsomók megnagyobbodása, a lymphadenitis, a fejfájás, a nyirokcsomók megnagyobbodása, a bőr kiütése és a nyirokcsomók megnagyobbodása. A tünetek nagy csoportját az általános tünetek (lásd, táblázat) képezik, ezek között a leggyakoribbak a fejfájás, a nyirokcsomók megnagyobbodása, a bőr kiütése és a nyirokcsomók megnagyobbodása.

virágokból virágokból, a terápia megkezdéséhez felállítását célzóan orvosi tevékenységgel váltottak.